

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 april 2014 tot uitbreiding van de toelating van het middel Tectonik Pour-on, toelatingnummer 14067 N

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegen en knutten (Culicoides) op runderen in de periode april tot en met oktober.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dienen resten die het middel bevatten bij gebruik in de stal te worden afgevoerd naar de mestopslag.

Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

De totale dosis op de ruglijn van het rund aanbrengen, van de nek tot de basis van de staart met behulp van het doseercompartiment van de fles of met behulp van de bijgeleverde handspruit (2,5 liter fles). Ongeveer een vierde deel van de dosis op de nek aanbrengen. Alle dieren van een koppel tegelijk behandelen.

Dosering: 10 ml per 100 kg lichaamsgewicht met een maximum van 25 ml per rund.
Indien nodig, behandeling herhalen na 4 weken voor knutten en na 7 weken voor vliegen.

Resistentiemanagement:

In het kader van resistentiemanagement verdient het aanbeveling om niet meer dan 5 behandelingen per jaar toe te passen en mag de geadviseerde dosering niet verlaagd worden. Wissel het gebruik van Tectonik Pour-on (werkzame stof permethrin) af met middelen die zijn gebaseerd op werkzame stoffen uit een andere chemische groep zoals organofosfaten.

Minimale wachttermijnen:

Vlees: 3 dagen

Melk: geen